

Pleje af sået græs

Græs sås bedst i august/september. Alternativt en forårssåning til medio maj. En sået græsplæne kan først forventes at være slidstærk efter én hel vækstsæson.

Plejen vil i de kommende år kunne omfatte:

- 1) **Vanding.** Nysået græs bør generelt ikke kunstvandes på grund af risikoen for at vand, sammen med græsfrø, samles i lavninger. Tillige giver kunstvanding jorden en hård skorpe der påvirker spiringen negativt. Men fugtighed i jorden er en forudsætning for at græsfrøene spirer så skal der vandes i længerevarende tørre perioder, skal det ske med fin forstøvning.
- 2) **Fremspiring.** Græsset fremspirer, afhængig af sort og fugtighed, efter 1-4 uger. En noget uens fremspiring kan sjældent undgås. Bare pletter kan evt. skyldes vandmangel eller at frøene er blæst vækst. Evt. huller løsnes let i de øverste centimer med en rive, hvorefter der nysås.
- 3) **Ukrudt.** Der er helt normalt at der efter såning fremspirer en mængde ukrudtsarter sammen med græsset. De fleste er enårige arter der forsvinder i takt med at græsset vokser til og klippes. Enkelt større og aggressive arter kan luges væk i starten. En egentlig sprøjtning med ukrudtsmidler må tidligst foretages 3-4 måneder efter såning.
- 4) **Gødskning.** Når græsset er vel fremspiret og tæt i væksten stimuleres med en plænegødning, ca. 2,5 kg pr. 100 m². Herefter kan den årlige gødskning udføres som f.eks. 3 årlige gødskninger i april, juli og september hvor der gives samme dosering af en plænegødning. Klippes græsset med opsamler kan der øges til 5 gødskninger i vækstsæsonen.
- 5) **Klipning.** Græsset klippes 1. gang ved ca. 6 cm græshøjde. Herefter klippes græsset efter behov. Ved ca. 5 cm højde klippes ned til 3 cm, aldrig kortere. Klip ikke mere end 1/3 af græshøjden i én klipning. I meget tørre perioder bør klippehøjden øges lidt.
- 6) **Verikalskæring.** Der må tidligst vertikalskæres efter 1. vækstsæson. Herefter udføres vertikalskæringer bedst i april/maj eller august/september.
- 7) **Mos.** Mos i græs er et symptom på græs der trives dårligt. Dette ses hyppigst på fugtige og skyggefulde steder. Generelt forebygges mosdannelse bedst ved at holde en velplejet plæne hvor græsset trives optimalt. Dvs. gødskning og regelmæssige klipninger hvor græsset ikke klippes for kort (dette svækker græsset). Årlige vertikalskæring eller plæneluftninger kan desuden forbedre græssets vækstbetingelser og begrænse mosdannelsen. Er der tale om sur jord (lavt reaktionstal) gives der kalk. Mos kan kortvarigt bekæmpes med en blanding af 3 kg svovlsur ammoniak og 1 kg. jernvitriol opblandet i fint sand. Dette rækker til 100 m². Udbringes bedst om morgenen på dugvådt græs og hvor der forventes sol i løbet af dagen. Det visne mos rives efterfølgende sammen.
- 8) **Skadedyr og sygdomme.** For at forebygge svampesygdommen sneskimmel i græs bør der i efteråret rives græsafklip og blade sammen så plænen får luft. I græsset kan der også komme skadelige insekter af f.eks. stankelbenslarver eller gåsebillelarver. Disse lever af græsrodde og kan lave betydelige skader, især på lette jorder. Bekæmpes specifikt med kemiske bekæmpelsesmidler.